



# TACHIPIRINA

用于新生儿, 62.5 mg 栓剂  
用于婴儿, 125 mg 栓剂  
对乙酰氨基酚

**此说明书含有重要信息, 使用药物前请认真阅读。**

服用本药物时必须严格遵守本页或医师或药剂师的指示。

- 请保留说明书。您可能需要再次阅读说明书。
- 如果需要了解详情或建议, 请向药剂师咨询。
- 如果出现任何副作用, 请咨询医生或药剂师。这可能包括说明书未列出的副作用。见第4部分。
- 治疗3天后如果病情未见好转或症状加重, 则必须与医生联系。

**说明书内容:**

1. Tachipirina及其用途
2. 服用Tachipirina之前必须了解什么
3. 如何服用Tachipirina
4. 潜在副作用
5. Tachipirina保存方法
6. 包装内容和其他信息

**1. Tachipirina及其用途**

Tachipirina含有的活性成分为对乙酰氨基酚, 可减轻发热(退热剂)和缓解疼痛(镇痛剂)。

用于新生儿的Tachipirina和用于婴儿的Tachipirina, 必须用于**体重在3.2至12 kg间婴儿**, 并用于:

- 对症治疗一些发热性疾病, 例如流感、发疹性疾病(常见于儿童和青少年的感染性疾病)、急性呼吸道疾病等;
- 各种类型和来源的疼痛(头痛、神经痛、肌肉痛和其他中等程度的疼痛)。

如果您的孩子治疗3天后病情未见好转或病情加重, 则必须与医生联系。

**2. 服用Tachipirina之前必须了解什么**

**Tachipirina不得用于以下情况的儿童**

- 如果对乙酰氨基酚或此药物的其他成分(见第6部分)过敏;
- 如果他们存在严重的溶血性贫血(红细胞破坏);
- 如果他们患有严重肝病(严重干细胞疾病)。

**警告与注意事项**

使用Tachipirina前请咨询医生或药剂师。

对于以下情况, 儿童应谨慎使用Tachipirina:

- 患有厌食症(以食欲不振或减少为特征的饮食行为障碍);
- 患有贪食症(饮食行为障碍, 患者摄入了过量食物, 随后使用各种方法排出食物);
- 存在恶病质(一种以慢性疾病引起的极度瘦弱、肌肉量减少和皮肤变薄为特征的病况);
- 长期饮食不当(长期营养不良);
- 存在脱水(体内水分/液体严重流失);
- 患有低血容量症(体内血容量低);
- 患有降低肝脏功能的疾病(肝功能损伤、肝炎、吉尔伯特综合症);
- 同时使用改变肝功能的药物(请参阅“其他药物和Tachipirina”);
- 体内葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏(一种人体正常情况下存在的物质, 缺乏该物质会导致血液疾病);
- 存在严重的溶血性贫血(红细胞破坏)。

高剂量和/或长期使用

高剂量和/或长期使用该药物可能导致肾脏和血液改变, 有时甚至会达到严重程度。这种情况下, 医生会进行特定检测, 以监测肝、肾功能和血液成分随时间的变化。

将该药用于儿童前, 请告知医生患儿是否患有任何肝脏或肾脏疾病。

**儿童和青少年**

Tachipirina栓剂可用于体重在3.2 kg到12 kg的儿童(参见第3节“如何服用Tachipirina”)。

**其他药物和Tachipirina**

如果儿童正在服用任何药物、近期曾经服用任何药物或可能服用任何药物, 请告知医师。

特别是要告诉医生, 打算服用该药物的人是否正在服用:

- **含有对乙酰氨基酚的药物。**在对乙酰氨基酚治疗期间, 在服用任何其他药物之前, 请确认药品不含对乙酰氨基酚, 因为大剂量服用对乙酰氨基酚会导致严重的不良反应;
- **氟霉素**(一种抗生素), 该药物会增加副作用风险;
- **抗凝剂**(用于改善血流的药品)。如果大剂量使用对乙酰氨基酚治疗(每天4 g, 至少4天), 那么只应在严格医学监督下使用Tachipirina;
- **利福平**(一种抗生素);
- **西咪替丁**(用于治疗胃溃疡的药物);
- **抗癫痫药**(用于治疗癫痫的药物), 例如格鲁米特、苯巴比妥或卡马西平;
- **齐多夫定**(用于治疗HIV的药物)。

这些药物与Tachipirina一起使用需要密切的医学监督。

干扰血液检查

如果服用这种药物的人必须进行血液检查, 请注意对乙酰氨基酚会干扰尿酸和血糖的测定结果。

**3. 如何服用Tachipirina**

本药用于儿童时必须严格遵守本页说明或医师或药剂师的指示。如果不确定, 请咨询医生或药剂师。

对于儿童, 必须按照基于体重的剂量用药。年龄作为体重的近似值, 仅供参考:

用于新生儿的Tachipirina 62.5 mg 栓剂

体重	年龄	剂量	一天多少次?
3.2-5 kg	大约从出生到2个月年龄	一次一粒栓剂	如果需要, 6小时后重复一次。  24小时内不得超过4粒栓剂。

用于婴儿的Tachipirina 125 mg 栓剂

体重	年龄	剂量	一天多少次?
6-7 kg	大约3-5个月	一次一粒栓剂	如果需要, 6小时后重复一次。  24小时内不得超过4粒栓剂。
7-10 kg	大约6-19个月	一次一粒栓剂	如果需要, 4-6小时后重复一次。  24小时内不得超过5粒栓剂。
11-12 kg	20-29个月 大约	一次一粒栓剂	如果需要, 4小时后重复一次。  24小时内不得超过6粒栓剂。

体重超过12 kg的儿童, 可以使用其他Tachipirina栓剂或其他特定形式的Tachipirina。请咨询医生或药剂师。

## 如果儿童存在严重肝损伤(肝功能严重下降)

如果医生诊断您的孩子患有严重肝损伤,则两次给药间必须至少等待8小时。

## 用药时间

在没有咨询医生的情况下,请勿给孩子服用Tachipirina超过3天。医生必须评估连续3天以上的治疗需求。

## 如果超量服用Tachipirina

如果意外超量服用/吞入Tachipirina,请立即联系医生或前往最近医院。

## 症状

如果意外摄入极高剂量的对乙酰氨基酚,可能在最初12-48小时内出现以下症状:

- 厌食症(食欲不振或降低)、恶心和呕吐,随后出现一般状况的明显恶化,血液实验室检测水平改变(血液中胆红素、乳酸脱氢酶和肝转氨酶水平升高,凝血酶原水平降低);
- 肝损伤,可导致昏迷后死亡

过量服用对乙酰氨基酚会增加中毒风险,并可能导致死亡,特别是在以下情况下:

- 如果服用该药品的患者患有肝病;
- 慢性酒精中毒;
- 如果服用该药物的患者长期饮食不当(慢性营养不良);
- 如果服用该药物的患者正在服用其他增加肝功能的药品或物质。

## 治疗

医生将根据症状的性质和严重程度提供最适合的支持性治疗。

## 如果漏服Tachipirina

如果儿童漏服,不得加倍服用。

## 如果停止使用Tachipirina

如果对本品适用有其他问题,请咨询医生或药剂师。

## 4. 潜在副作用

同所有药物一样,该药物会引起一些不良反应,尽管不是所有人都会出现。

如果儿童出现以下任何副作用,请**停止**使用该药并**立即**联系医生:

- **过敏反应:**
  - 皮肤发红伴有发痒(荨麻疹)
  - 喉咙肿胀(喉头水肿)
  - 手、脚、脚踝、脸、嘴唇、舌头和/或喉咙肿胀(血管性水肿)
  - 严重过敏反应(过敏性休克)。

该药物服用者可能出现以下副作用,这些副作用的相关数据不足,无法确定其发生频率。

- 血小板计数下降(血小板减少症)
- 白细胞计数下降(白细胞减少症/粒细胞缺乏症)
- 血中负责运输氧气的血红蛋白降低(贫血)
- 眩晕
- 肠胃反应
- 肝功能受损
- 肝脏炎症(肝炎)
- 红斑、水泡伴随周围皮肤脱离、水泡、皮肤出疹(多形性红斑、Stevens-Johnson综合征、中毒性表皮坏死)
- 肾功能受损(急性肾衰)
- 肾脏炎症(间质性肾炎)
- 尿中有血(血尿)
- 肾脏产尿停止或减少(无尿)

已报告一些极罕见的严重皮肤反应。

## 不良反应迹象

如果出现任何副作用,请咨询医生或药剂师。这可能包括说明书未列出的副作用。也可以通过全国报告系统网站

<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>直接报告副作用。报告副作用可以提供与此药物相关的更多安全信息。

## 5. Tachipirina保存方法

请将药品放在儿童接触和看不到的地方。  
请保存在不超过25°C的环境中。

如果超过包装注明的有效期,则不得服用。有效期是当月最后一日。不得将此药物丢入废水或家庭废物中。请咨询药剂师了解如何处理不再需要的药物。这样会有助于保护环境。

## 6. 包装内容和其他信息

### 用于新生儿的Tachipirina 62.5 mg栓剂包含

- 活性成分:对乙酰氨基酚(每粒栓剂含有62.5 mg的对乙酰氨基酚)。
- 其他成分:半合成的固体甘油酯。

### 用于婴儿的Tachipirina 125 mg栓剂包含

- 活性成分:对乙酰氨基酚(每粒栓剂含有125 mg的对乙酰氨基酚)。
- 其他成分:半合成的固体甘油酯。

### Tachipirina性状描述与包装内容

Tachipirina 栓剂有62.5 mg或125 mg规格,外观为白色到米黄色,包装盒内含有10粒栓剂:2个白色泡罩包装,每个含有5粒栓剂。

有些包装规格可能未上市。

### 上市许可持有者

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.  
Viale Amelia, 70  
00181 Rome, Italy (意大利)


### 制造商

TACHIPIRINA, 用于新生儿, 62.5 mg栓剂  
A.C.R.A.F. S.p.A.  
Via Vecchia del Pinocchio, 22  
60131 Ancona, Italy (意大利) .

TACHIPIRINA, 用于婴儿, 125 mg栓剂  
A.C.R.A.F. S.p.A.  
Via Vecchia del Pinocchio, 22  
60131 Ancona, Italy (意大利) .

Istituto de Angeli Italia s.r.l.  
Località Prulli 103/C  
50066 Reggello (FI), Italy (意大利)

### 本说明书于2020年7月最后修改。

请扫描二维码或访问  <https://leaflet.angelinipharma.com/L27> 查阅更新后的手册内容,提供多种语言版本